Protein kinase C (PKC) a valle di PLC

PROTEIN KINASE C (PKC) ISOFORMS

Substrati della PKC

✓ Fosforila **canali ionici** nelle cellule nervose → Altera l'eccitabilità della membrana plasmatica

✓ Aumenta la **trascrizione** di geni specifici

- Fosforilazione di una proteina citosolica (MAPK) che attiva una proteina regolatrice della trascrizione (Elk-1)
- Fosforilazione di I κ -B che rilascia la proteina regolatrice di geni NF- κ B che migra nel nucleo e attiva la trascrizione di geni specifici

LA BIOCHIMICA DEI SENSI

LA VISIONE

BASTONCELLO

Segmento esterno

Segmento interno

Neuronal
signal
to brain

① L'assorbimento della luce converte l'11-*cis*-retinale in tutto-*trans*-retinale, attivando la rodopsina

② La rodopsina attivata catalizza la sostituzione di GDP con GTP sulla trasducina (T), che poi si dissocia in T_α-GTP e T_{βγ}

③ La T_α-GTP attiva la cGMP fosfodiesterasi (PDE) mediante il legame e la rimozione della sua subunità

④ La PDE attiva riduce la concentrazione di cGMP al di sotto dei livelli necessari per mantenere aperti i canali per i cationi

⑧ La rodopsina chinasi (RK) fosforila la rodopsina "sbiancata"; questa reazione è stimolata dalla bassa concentrazione di Ca²⁺ e dalla recoverina (Recov). L'arrestina (Arr) si lega alla regione carbossi-terminale fosforilata della rodopsina, inattivandola

⑨ Lentamente l'arrestina si dissocia e la rodopsina viene defosforilata; il tutto-*trans*-retinale è sostituito con l'11-*cis*-retinale. La rodopsina è ora pronta per un altro ciclo di fototrasduzione

⑦ La diminuzione della concentrazione di Ca²⁺ attiva la guanilil ciclasti (GC) e inibisce la PDE; l'aumento della concentrazione di cGMP verso i valori che si hanno al buio riapre i canali per i cationi e il valore di V_m ritorna a quello precedente all'arrivo dello stimolo

⑤ I canali per i cationi chiusi impediscono l'afflusso di Na⁺ e di Ca²⁺; la membrana si iperpolarizza e questo segnale viene trasferito al cervello

⑥ Il continuo efflusso di Ca²⁺ attraverso lo scambiatore Na⁺-Ca²⁺ riduce la concentrazione citosolica di Ca²⁺

Membrana plasmatica

(Spettro visibile dell'uomo: 380-750 nm)

**I VARI TIPI DI
CECITA' AI
COLORI
DIPENDONO DA
MUTAZIONI
DIVERSE A
CARICO
DELL'OPSINA**

OLFATTO

① L'odore (O) arriva allo strato mucoso e si lega direttamente ad un recettore olfattivo (OR) o ad una proteina di legame (BP) che lo trasporta all'OR

② L'OR attivato catalizza lo scambio GDP-GTP su una proteina G (G_{olf}), provocando la sua dissociazione in subunità α e $\beta\gamma$

③ G_{α} -GTP attiva l'adenilil ciclasi, che catalizza la sintesi del cAMP, aumentando la concentrazione di [cAMP]

④ Canali cationici controllati dal cAMP si aprono. Ca^{2+} entra, aumentando la concentrazione interna di Ca^{2+}

Potenziale del recettore

⑤ I canali per il cloruro (Cl^{-}) controllati dal Ca^{2+} si aprono. L'efflusso di Cl^{-} depolarizza la cellula, inviando un segnale elettrico al cervello

⑦ G_{olf} idrolizza il GTP a GDP, spegnendo se stessa. La PDE idrolizza il cAMP. Il recettore chinasi fosforila OR, inattivandolo. La molecola odorosa viene rimossa mediante il metabolismo

⑥ Il Ca^{2+} riduce l'affinità del canale cationico per il cAMP, abbassando la sensibilità del sistema alle molecole odorose

INATTIVAZIONE

Potenziale d'azione

GUSTO

Membrana apicale

Membrana basolaterale

Cellula gustativa

Vasopressina

↓[cAMP]

Adrenalina

↑[cAMP]

Luce

↓[cGMP]

↓P_{Ca²⁺,Na⁺}

Odorizzanti

↑[IP₃]

↑P_{Ca²⁺}

↑[cAMP]

↑P_{Ca²⁺,Na⁺}

Sapore dolce

↑[cAMP]

↓P_{K⁺}