Arto & Digit patterning in vertebrate limb

Arto

- Polarità secondo i 3 assi cartesiani
- Asimmetria
- Differenze tra arto sup e inf
- **ma ...**
- Struttura generale ben conservata
 - Stilopodio
 - Zeugopodio
 - Autopodio

Piano di sviluppo ben preciso

- Ben studiato
 - Organo non essenziale alla vita
 - Possibili facile manipolazione, studi genetici
- Risultato di combinazione coordinata di più processi: migrazione, stabilizzazione, apoptosi (PCD)
 - regole morfogenetiche generali
 - seguite da tutti i tetrapodi (stessi geni Hox –arti ant: cranialmente a Hoxc6-, indipendentemente da vertebra)
 - stesse molecole segnale in specie diverse

Abbozzo/gemma dell'arto

- Deriva da campo dell'arto
- Esperimenti di ablazione / trapianto
- Esperimenti di marcatura

- Capacità regolativa (sistema equipotenziale armonioso)
 - exp di suddivisione
 - riscontro in natura (girini infestati da parassiti)

Rane deformi con più arti

Cisti in zone prospettiche per abbozzo artone inducono suddivisione (meccanismo regolativo)

Abbozzo degli arti

- Asse mesenchimale rivestito da cappuccio ectodermico apicale (al limite estremo: cresta ectodermica apicale)

Abbozzo arto ant: **TBX5**; Abbozzo arto post: **TBX4**
A monte: **acido retinoico**

Abbozzo dell'arto

32

37

Mesoderma laterale somatico e somiti per formare l'arto

Diverse strutture partecipano alla formazione degli arti

- Mesoderma laterale → ossa, tendini, legamenti, vasi
- Somiti → muscolatura
- Creste neurali → melanociti, cellule di Schwann, derma

(exp di trapianto quaglia-pollo)

Valore di posizione

- La determinazione avviene per passaggi successivi
- Specificato → determinato → differenziato
- Le cellule sentono la loro posizione: accesi geni marcatori di posizione (determinazione regionale, i.e)

valore di posizione

Specificazione
dell'identità
dell'arto
(anteriore/sup e
posteriore/inf)
(rispettivamente
Tbx5 e Tbx4)

Figure 22-8 Molecular Biology of the Cell 5/e (© Garland Science 2008)

Modello combinatoriale per specificare arto nei suoi segmenti

1 = Tbx5 → arto ant

1a = Tbx4 → arto post

Dopo la decisione circa l'identità dell'appendice → esecuzione del programma

Attivazione a cascata e anche in direzioni diverse (molecole segnale)

-
- **Acido retinoico** →
 - mesoderma: **TBX5** e TBX4 induttori (exp con espressione ectopica o KO) →
 - Geni omeotici: Hoxa, Hoxd (se mutati: riduzione o perdita di elementi) → CEA (**FGF8**) e ZPA (cartilagine)
 - **FGF10**, Wnt, BMP (asse prox-dist e ant-post)
 - RFNG (radical fringe) → Wnt-7a/En-1 (engrailed) (asse dorso-ventr)
 - I centri di segnalazione lungo i 3 assi interagiscono

Espressione/ruolo di FGF10 nello sviluppo dell'arto del pulcino

Arto ectopico indotto da cellule secernenti FGF

Arto chimerico (ant/post): FGF10 attiva il programma specificato da Tbx5/Tbx4

Nella zona intermedia: porzione ant specificata da Tbx5 e
porzione post specificata da Tbx4 → **chimera**

Arto **chimerico**
(ant/post):
FGF10 attiva il
programma
specificato da
Tbx5/Tbx4

Nella zona intermedia: porzione ant specificata da Tbx5 e
porzione post specificata da Tbx4

Centri di segnalazione nell'abbozzo dell'arto

CEA = cresta ectodermica apicale

PZ = zona di progressione

ZPA = zona con attività polarizzante

CEA induce abbozzo; FGF

CEA mantiene in stato non diff la PZ

ZPA: RA, Shh, controllato da FGF

Ruolo
essenziale
di **CEA**
nello
sviluppo
dell'arto

Produce
FGF8

In alcuni testi
CEA = AER
(apical ectodermal
ridge)

Figura 16.10
Sommario degli esperimenti che dimostrano l'azione della cresta ectodermica apicale (AER) sul mesenchima sottostante. (Da Wessells 1977, modificato.)

Rimuovendo CEA lo sviluppo si blocca

Espressione di FGF8 in CEA

(A)

(B)

(C)

Centri di segnalazione nell'abbozzo dell'arto

CEA = cresta ectodermica apicale

PZ = zona di progressione

ZPA = zona con attività polarizzante

CEA induce abbozzo; produce FGF8

CEA mantiene in stato non diff la PZ

ZPA: RA, Shh, controllato da FGF

Attivazione a cascata e anche in direzioni diverse (molecole segnale)

-
- **Acido retinoico** →
 - mesoderma: **TBX5** e TBX4 induttori (exp con espressione ectopica o KO) →
 - Geni omeotici: Hoxa, Hoxd (se mutati: riduzione o perdita di elementi) → CEA (**FGF**) e ZPA, x cartilagine
 - **FGF10**, Wnt, BMP (asse prox-dist e ant-post)
 - **RFNG** (radical fringe) → Wnt-7a/En-1 (engrailed) (asse dorso-ventr)
 - I centri di segnalazione lungo i 3 assi interagiscono

I tre centri di segnalazione nell'abbozzo dell'arto

Asse prox-distale

I due modelli per specificare arto su asse prox-distale

A. modello di progressione
B. modello di specificazione precoce

Compromesso →

C. modello destinazione precoce e espansione progenitori
(apoptosi su 200 μm più distali)

Determinazione su asse prox-dist: Hox

Delezione paraloghi geni Hox → mancanza segmenti arto

Espressione di geni Hox nell'arto (uccello: assi prox-dist e ant-post)

Geni Hox specificano lungo asse prox-dist

Mutazione HOXD-13 → sinpolidattilia

Profilo di
espressione
dei geni Hox
nell'abbozzo
dell'arto
(mammifero)
(topo: asse ant-post)

Modulazione espressione geni HOX nel tempo → determinazione

Attivazione a cascata e anche in direzioni diverse (molecole segnale)

-
- **Acido retinoico** →
 - mesoderma: **TBX5** e **TBX4** induttori (exp con espressione ectopica o KO) →
 - Geni omeotici: **Hoxa**, **Hoxd** (se mutati: riduzione o perdita di elementi) → **CEA** (FGF) e **ZPA**, x cartilagine
 - **Shh**, **BMP** (asse prox-dist e **ant-post**)
 - **RFNG** (radical fringe) → **Wnt-7a/En-1** (engrailed) (asse dorso-ventr)
 - I centri di segnalazione lungo i 3 assi interagiscono

Asse antero-post

ZPA

Zona di attività polarizzante

- **Informazione posizionale** nell'organo che sta formandosi
- La regione polarizzatrice segnala
- **I valori antero–posteriori** sono codificati con linguaggio molecolare e solo alla fine tradotti nell'**anatomia delle dita**

Trapianto ectopico di ZPA ($shh+$) raddoppia le dita dell'arto (pollo)

(A) 500 μ m

ANTERIOR

POSTERIOR

(B)

develops into

ANTERIOR

(C)

polarizing region cut from donor wing bud
grafted to anterior region of host wing bud

develops into

Gradiente di
concentrazione
del segnale

Risposta del tutto
o nulla delle
cellule bersaglio
(diversi livelli
soglia $\rightarrow$
risposte
graduate)

ZPA

- Identificata nella zona post dell'ala del pollo da stadi precoci fino a quando cominciano a formarsi le dita
- Ben conservata attraverso alle specie
- Stesso segnale interpretato in modo diverso in specie diverse
- Inizialmente: ZPA produce un morfogeno che agisce a lungo raggio, specificando valori di posizione antero–posteriori

Il morfogeno

- Diffonde
- Si forma un gradiente
- Questo dà
informazione
di posizione

Shh mantiene **gradiente BMP** negli spazi interdigitali, e questo specifica identità del dito anteriore

Meccanismo d'azione di shh

- ZPA: acido retinoico → SHH → Gli1, Gli2, Gli3
- Gli3: 2 forme entrambe traslocate nel nucleo
 - **attivatore (proteina full-size)**: alti livelli nella regione POST
 - **repressore (tronco)**: alti livelli in regione ANT
- SHH rimuove repressione nella regione posteriore

Mutante Gli3-/-

Shh → gradiente Gli3

→ impedisce polidattilia e dà identità del dito

Attivazione a cascata e anche in direzioni diverse (molecole segnale)

-
- **Acido retinoico** →
 - mesoderma: **TBX5** e TBX4 induttori (exp con espressione ectopica o KO) →
 - Geni omeotici: Hoxa, Hoxd (se mutati: riduzione o perdita di elementi) → CEA (**Shh**) e ZPA, x cartilagine
 - FGF10, Wnt, BMP (asse prox-dist e ant-post)
 - RFNG (radical fringe) → **Wnt-7a/En-1** (engrailed) (**asse dorso-ventr**)
 - I centri di segnalazione lungo i 3 assi interagiscono

Asse dorso-ventr

Wnt7a (→ Lmx1) dà informazione per dorsalizzazione arto

Principali vie di segnalazione: ruolo centrale di CEA

Induzione

Mantenimento

Coordinazione dei 3 assi: ruolo centrale di Shh

1. Shh mantenuto in ZPA da FGF8 e hHand
2. Shh → FGF in CEA (doppia inibizione Gremlin --| BMP --| FGF)
3. Shh mantenuto da Wnt7a recluta cellule in ZP
4. Shh in ZPA mantiene gradiente Gli3 attivatore

Principali vie di segnalazione: ruolo centrale di CEA

Induzione

Mantenimento

Differenziamento

Gradiente di FGF

Apoptosi in aree definite dell'arto in via di sviluppo

I muscoli degli arti derivano dai somiti (exp di trapianto con cellule con marcatore genetico)

Sviluppo embrionale: i somiti

Abbozzo dell'arto

32

37

Formazione componente muscolare dell'arto

Migrazione dei precursori dei mioblasti negli abbozzi degli arti

I precursori dei mioblasti arrivano e maturano ad ondate successive